

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Towarzystwo Chemiczne "DANMAR", ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź;  
tel/fax: +48 42 6509550, +48 42 6506695;  
e-mail: danmar@id.onet.pl

**Przeznaczaj etykiety-instrukcji stosowania w celu  
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

# IKAR 95 EC®

**Zezwolenie PZH/HT/207/2007**

Adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków owadobójczych stosowanych w leśnictwie do oprysków ultra niskobojęściowych (ULV) i niskobojęściowych (LV) aparaturą agrolotniczą.

Zawartość substancji aktywnej:

**olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 95%**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

**Uwaga!**

**1. Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**

**2. Nie zanieczyszczaj wód preparatem lub jego opakowaniem.**

**DZIAŁANIE PREPARATU**

IKAR 95 EC powoduje zwiększenie przychepności środka owadobójczego do powierzchni liści, zapobiega zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny; ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej zmniejszając znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

**ZASTOSOWANIE**

IKAR 95 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania w leśnictwie ze środkami owadobójczymi.



**ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

IKAR 95 EC stosować łącznie ze środkami owadobójczymi zgodnie z zaleceniami Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zalecana dawka: 0,7 - 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 1,3 - 2,3 l/ha

Środek owadobójczy stosować w zalecanych dawkach.

**PRZECIWSKAZANIA**

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagaj jakiego obowiązuje dla środków, z którymi stosuje się IKAR 95 EC. Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej, nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrodach.

**OKRES KARENCEJ** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

- nie dotyczy

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT** (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

**SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w polowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do

zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu IKAR 95 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania po środkach owadobójczych przepłukać trzykrotnie wodą, a popluczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opakowania po preparacie IKAR 95 EC opróżnić, nie płukać, zwrócić do producenta.

Opryskiwacz z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerwy w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

**PRZECIWOYWANIE**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

**WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**  
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się preparat IKAR 95 EC.  
Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Zanieczyszczone czy przemycić natchmiast dużą ilością wody zasięgnąć porady lekarza.  
Zanieczyszczoną skórę natchmiast przemycić dużą ilością wody.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie pokłnięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

**UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CEŁÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.**

**Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682-04-04

Kraków (12) 411-99-99

Lublin (81) 740-89-83

Łódź (42) 657-99-00

Poznań (61) 847-69-46

Rzeszów (17) 866-40-25

Sosnowiec (32) 266-11-45

Tarnów (14) 631-54-09

Warszawa (22) 619-66-54

Wrocław (71) 343-30-08

**Okres ważności - 2 lata**

**Data produkcji -**

**Zawartość netto -**

**Numer partii -**